



ASOCIACIÓN
PERUANA DE
LA HERNIA



ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA



Dr. David Dávila Dorta

Cirugía General y Digestivo

Hospital VITHAS-NISA 9 de Octubre

VALENCIA – España





II Congreso

Sociedad Hispanoamericana de Hernia

3, 4 y 5 de mayo de 2018

Aula Magna de la Fundación Jiménez Díaz

Madrid - España



Los puntos más importantes de la anatomía de la región inguinocrural cuando operamos por vía anterior y posterior abierta

Vías de acceso en cirugía de la hernia inguino-femoral


**ABORDAJE
POSTERIOR VIDEOASISTIDO**

4

**ABORDAJE
POSTERIOR "ABIERTO"**

**ABORDAJE
INGUINAL ANTERIOR**

**ABORDAJE
TRANSINGUINO-PREPERITONEAL
(TIPP)**






Vía Anterior

Hernia Inguinal

**MODELOS TÉCNICOS
PARADIGMÁTICOS**


Técnica de Bassini

Técnica de Zagdoun (“Lichtenstein”)




Aponeurosis del m. oblicuo externo

**Diástasis fibrilar
aponeurótica**





Diástasis aponeurótica





Cordón espermático



Vasos, c. deferente, NII y r. genital





Saco herniario





La fascia transversalis



Identificación de nervios periféricos



Evolución del “posoperatorio” en la cirugía de la hernia inguinal



**“ Inmovilidad posoperatoria ”
(hasta los años 60)**



**Recidiva herniaria
(década de los 60 – 90)**




**Neuropatía posoperatoria crónica
(desde la década 90 -)**

PubMed (1982 – 2017)
búsqueda por este título:

“ Dolor crónico después de reparación de hernia inguinal ”

[Chronic pain after inguinal hernia repair]




TEP vs. Lichtenstein: Dolor Crónico Neuropático

1370 pacientes
randomizados

Eklund A et al.


Swedish Multicenter Trial of Hernia Repair by Laparoscopy (SMIL).

Br J Surg 2010




Nervios inguinales perifericos

- 1 Iliohipogástrico
- 2 Ilioinguinal
- 3 Femorocutáneo lat.
- 4 Genitofemoral
 - 4' Rama femoral
 - 4'' Rama genital
- 5 Femoral
- 6 Obturador
- 7 Tronco lumbosacro



Áreas Críticas de Dolor Inguinal Posoperatorio Neuropático

- 1 Iliohipogástrico
- 2 Ilioinguinal
- 3 Femorocutáneo lat.
- 4 Genitofemoral
- 4' Rama femoral
- 4' Rama genital
- 5 Femoral
- 6 Obturador
- 7 Tronco lumbosacro





Muchos estudios anatómicos de los nervios inguinales han sido realizados enfatizando la “**variabilidad**” del curso de los nervios en **zonas anatomo-quirúrgicas** clínicamente relevantes”

Zonas anatómicas de los trayectos de los nervios inguinales: variabilidad y vulnerabilidad

Moosman DA et al. Surg. 1977;133:146-148
Oelrich TM et al. Anat Rec. 1977;189:233-236
Papadopoulos NJ et al. Anat Anz. 1981;149:357-364
Mandelkow H et al. Surg Radiol Anat. 1988;10:145-149
Chevallier JM et al. Ann Chir.1996;50:767-775
Akita K et al. Surg Radiol Anat. 1999;21:1-5
Diop M. Morphologie. 2000;84:29-32
Liu WC et al. Eur J Surg. 2002;168:145-149
Al-dabbagh AK. Surg Radiol Anat. 2002;24:102-107
Rab M et al. Plast Reconstr Surg. 2001;108:1618-1623
Jacobs CJ et al. Surg Radiol Anat. 2004;26:66-69
Whiteside JL et al. Am J Obstet Gynecol. 2003;189:1574-1578
Wijsmuller AR et al. World J Surg.2007;31:414-420

Nervio iliohipogástrico

A


Distancia
Perforación del NIH
en Apo. Obl. Ext.
al orificio ing. ext.

3.8 cm
(2.5 – 5.5)

B

Distancia
NIH a
Orificio ing.ext.

2.5 cm
(1.5 – 4.4)



Antes de perforar la
Apo. Obl. Ext.

Rama única	83 %
2 – 3 ramas	17 %

Perforada
la Apo. Obl. Ext.

Rama única	89 %
2 – 3 ramas	11 %

+ ramas aberrantes

Nervio ilioinguinal

Ⓐ


Perfora (post-lat.)
Apo. Obl. Int.

57 %

Ⓑ

Perfora
Apo. Obl. Int.
en orificio ing. ext.

43 %



Ⓒ

Se incorpora a la
rama genital
del n. genitofemoral

43.7 %


Rama genital del n. genitofemoral

(A)
Penetra (post-lat.) en
el orificio ing. profundo.
57 %

(B)
Discurre junto a los
vasos espermáticos
43 %

(C)
Fibra del NII incorporada
a la rama genital
del n. genitofemoral
43.7 %


(D)
Se identifica en el
Orificio ing. superficial
94 %



lateral
28 %

medial
28 %


dorsal
44 %








Especial atención a estos 2 tipos “anatómicos” de hernias inguinales

**Hernia de Spiegel Inferior
“ Hernia suprainguinal ”**









Vía Anterior





Transinguino-preperitoneal

T I P P


**MODELO TÉCNICO
PARADIGMÁTICO**





Técnica de Rives





Chevrel JP







Vía Anterior



Hernia Femoral


**MODELOS TÉCNICOS
PARADIGMÁTICOS**

Técnica de Gimbernat (1772)


Técnica de Wantz

Técnica de Lichtenstein






Wantz GE et al.
J Am Coll Surg. 1996;182:417-422



Lichtenstein IL et al.
Am J Surg. 1974;128:439-444





Vía Posterior


Preperitoneal abierta

**MODELOS TÉCNICOS
PARADIGMÁTICOS**


Técnica de Nyhus

Técnicas de Stoppa / Wantz


(Nyhus / Wantz)




Corte sagital del canal inguinal derecho (visto desde medial)



Vista posterior de la pared abdominal anterior




**Musculatura plana
(o.Ext / o. Int. / transv.
con sus fascias)
(Nyhus / Wantz)**



**Hoja anterior
fascia m. recto
(Dávila)**

Sección aponeur. anterior m. recto + sección musculatura plana




**Cintilla iliopúbica de
Thomson**

**Ligamento de
Cooper**


**Saco herniario
y visceral**

**Fascia transversalis +
m. transverso**

**Cordón
espermático**



Hernia directa




Fascia transv. – m. transverso a


Cintilla iliopúbica de Thomson



Hernia mixta



Hernia femoral



L. Cooper




Cintilla iliopúbica a

Lig. de Cooper




Cintilla iliopúbica



Incisión / reconstrucción de la musculatura plana (oblicuo ext., int., transv., f.transv.)







Vista posterior de la pared abdominal anterior



-  Wantz / Stoppa
-  Nyhus
-  Dávila














Figura 2. Corte sagital de la ingle. Vía posterior preperitoneal abierta





CONSEJOS

Anatomo-quirúrgicos para la cirugía de la hernia inguino-femoral

Conocimiento anatómico de la estructura de la **pared anterior y posterior** de la ingle

Conocimiento anatomoquirúrgico de los **abordajes y técnicas** herniorráficas y hernioplásticas

Conocimiento neuroanatómico de las **áreas críticas** de riesgo de lesión neural
- variabilidad y vulnerabilidad -

