



II Congreso

Sociedad Hispanoamericana de Hernia

3, 4 y 5 de mayo de 2018

Aula Magna de la Fundación Jiménez Díaz

Madrid - España

grupo ARÁN de comunicación


Técnica de Celdrán, 25 años despues

M Enriqueta Bernal Sánchez

Fundación Jiménez Díaz

Madrid

Fundamentos de la técnica





Hernia Inguinal / Hernias asociadas

Direct	Direct/Fem.	Direct/Indir./Fem.	
312	15	4	6,08% - (19/312)

Indirect	Indir./Fem.	Indir./Direct/Fem.	
493	3	4	1,41% - (7/493)

- Bilateral: 13 / 18 (72.2%)


Celdrán A, 2003



Hernias inguinocrurales

- Exploración sistemática del anillo crural durante la reparación inguinal.
- Técnica de Lichtenstein en hernias indirectas
- Técnica común para hernias directas, directas-indirectas y crurales

A SINGLE TECHNIQUE FOR POLYPROPYLENE MESH HERNIOPLASTY OF INGUINAL AND FEMORAL HERNIAS



SURGERY, *Gynecology & Obstetrics*,
October, 1992, Vol. 175, 359-361

Técnica





FIG. 2. Closure of femoral ring.
FIG. 3. Fixation of the mesh on inguinal ligament, rectus sheath and conjoint muscle.

Recidiva




Fig. 1
Repair made without crossing the tails, in which keyhole hernias (sagittal view, A-A') may appear among the suture stitches when intraabdominal pressure (arrow) increases






Fig. 2
Original Lichtenstein technique, in which the spermatic cord (SC) runs between the two closed tails (sagittal view, A-A') and the deep inguinal ring remains closed when intraabdominal pressure (arrow) increases (IL: inguinal ligament)

Técnica actual



Nuestra serie

- Indirectas.....363 (41%)
- Inguinoescrotales.....36 (4,2%)
- Directas.....192 (22,7%)
- Directas-Indirectas..111 (13,1%)
- Crurales.....61 (7,2%)
- Otras.....81 (9,6%)
- Bilaterales.....171
- Total.....844

Recidiva 2 pacientes 0,23%
en relación con infección y
retirada de prótesis

[Hernia](#) . 2018; 22 (1): 1-165.

PMCID: PMC5809582

Publicado en línea 2018 12 de enero. Doi: [10.1007 / s10029-017-1668-x](https://doi.org/10.1007/s10029-017-1668-x)

Directrices internacionales para el manejo de la hernia inguinal

El grupo HerniaSurge

[La información del autor](#) ► [notas Artículo](#) ► [licencia y derechos de información](#) ►

- Suecia 2015: **Lichtenstein 64%**, TEP 25%, TAPP 3%.
- El uso de la cirugía laparoscópica varía de 0 a 55%
- Australia (55%), Suiza (40%), Países Bajos (45%) y Suecia (28%).
- Alemania 2009-2016: TAPP 39%, TEP 25%, **Lichtenstein 24%**, Plug 3%, Shouldice 2.6%, Gilbert PHS 2.5% y Bassini 0.2%.
- La técnica de Lichtenstein con la colocación onlay de una malla plana es el criterio estándar en la reparación de IH abierta.



Guías

- Guías de Práctica Clínica para Hernias de la Pared Abdominal(Actualización agosto 2015)
- Técnica por vía anterior abierta para hernias femorales



Conclusión

- Es una técnica fácil de reproducir
- Se realiza en CMA
- Puede realizarse con anestesia local
- Bajo coste
- Tiempo de realización 20-50 minutos
- Sirve para identificar hernias ocultas crurales

