



II Congreso

Sociedad Hispanoamericana de Hernia

3, 4 y 5 de mayo de 2018

Aula Magna de la Fundación Jiménez Díaz

Madrid - España




Desde la hernioplastia en H hasta la actualidad

María J. Fraile Vilarrasa
Hospital General de Villalba
Collado Villalba, Madrid

Punto de partida...

Punto de partida... Resultados?



Mayo J. An operation for the radical cure of umbilical hernia. Ann Surg 1901; 34: 276-280.

******«Los resultados de las operaciones para la cura radical de la hernia umbilical en adultos no han sido alentadores. Estos pacientes son generalmente obesos, con músculos abdominales débiles, y la delgadez y rigidez del anillo no ofrece condiciones mecánicas ventajosas para una unión duradera.»

Mayo J. An operation for the radical cure of umbilical hernia. Ann Surg 1901; 34: 276-280.

******Revisión de 101 pacientes, con 7 años de seguimiento, 15.4%. (29 pacientes se repararon con la técnica de Mayo, con cierre simple, con un 27% de recidiva, menor en pacientes tratados con prótesis)


García-Ureña MA, Rico P, Seoane J, et al. Hernia umbilical del adulto. Resultados a largo plazo en pacientes operados de urgencia. Cirugía Española 1994; 56: 302-306.

******Revisión de 51 pacientes, 12%


Runyon BA, Juler GL. Natural History of repaired umbilical hernias in patients with and without ascites. Am J Gastroenterol 1985; 80: 38-39.

Concepto: “Hernioplastia sin tensión”

Lichtenstein IL, Shulman AG, Amid PK, Montllor MM. The tension free hernioplasty. Am J Surg 1989; 157: 188-193.




Celdrán A, Bazire PJ, García-Ureña MA, Marijuán JL. H-hernioplasty: a tension free repair for umbilical hernia. Br J Surg 1995; 82: 371-372.





Amid PK, Shulman AG, Lichtenstein IL. Tensionfree repair of umbilical, epigastric, and incisional hernias. Contemporary Surgery 1994; 44: 177-180.


Porrero JL, Lomas M, García Villanueva A, Fernández Madrid JM. Técnica de la espiral en el tratamiento de la hernia umbilical. III Congreso Nacional de Videocirugía. Valencia 1993.




Chevrel JP, Flament JB. Traitement des éventrations de la paroi abdominale. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris-France), Techniques chirurgicales- Appareil digestif, 40-165. 1995 14p.




Serie histórica cirugía de pared (1996-2009): 1760 pacientes




Hernias de la línea media (357 pacientes)



Problemas añadidos...






Herniorrafia



“Hernioplastia en H”

“Hernioplastia con doble prótesis”



Y hoy?

- Estudio prospectivo con mallas progrip en pacientes con hernia umbilical asociada a diastasis.
- De momento 9 pacientes, 6 M, IMC medio 32.62, edad media 59.22, malla preperitoneal, tamaño medio de la hernia 2.5 cm.
- No complicaciones detectadas hasta este momento, con un seguimiento medio de casi 4 meses

Planteamiento...

Exploración ampliada de la línea media para garantizar una reparación eficaz e integral

Solución funcional-Tratamiento Global

