



II Congreso

Sociedad Hispanoamericana de Hernia

3, 4 y 5 de mayo de 2018
Aula Magna de la Fundación Jiménez Díaz
Madrid - España

grupo ARÁN de comunicación

Técnica de Milos en defectos primarios de la línea media.

Osmar Cuenca Torres

Hospital de Clínicas - Universidad Nacional Asunción



MILOS

Minimal **L**aparoscopic **O**pen **S**ublay


Dr . Wolfgang Reinpold

Defectos Primarios de la línea media

Hernia Umbilical

Hernia
Epigástrica

Diastasis de los
rectos







Opciones técnicas

Suturas.

- Sutura simple
- Técnica de Mayo

Mallas : puede colocarse en diversos planos.

- Pre aponeurótica
- Pre peritoneal
- Intraabdominal

Técnicas de reparación

MALLA

ABORDAJE ABIERTO

ABORDAJE
LAPAROSCOPICO

REPARACIÓN

UN DEFECTO


TODOS LOS DEFECTOS




- Mallas intra abdominales (separadores de tejidos) igual producen adherencias, son costosas.
- Medios de fijación = dolor

Complications of mesh devices for intraperitoneal umbilical hernia repair: a word of caution.

Muysoms FE¹, Bontinck J, Pletinckx P.



MILOS: CARACTERÍSTICAS





- Técnica híbrida
- Mini invasiva
- Abierta - endoscópica



MILOS

- Mínimo trauma.
- Instrumentales laparoscópicos con luz.
- Colocación en espacio retro muscular de malla bajo visión directa.
- Reparación anatómica de la pared abdominal por mínima incisión.
- Visión endoscópica.


ENDOTORCH









DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

- Incisión en el centro del defecto o a nivel umbilical
- Elevación de la pared con retractores.
- Técnica abierta bajo visión directa.
- Disección circunferencial de espacio retroperitoneal.











DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

- Disección de espacio pre peritoneal (8 cm.).
- Colocación de malla y cierre





CORTESIA DR.WOLFGANG REINPOLD





MILOS ENDOSCÓPICO

- TEP: e - MILOS.
- TROCARES CONVENCIONALES.
- MONOPUERTO (ALEXIS,SILS).



PUERTO UNICO: SILS - ALEXIS









MILOS

- Colocación de material protésico estándar de gran tamaño con mínimo acceso sin fijación en el mejor plano anatómico.
- Reduce costos.
- Reparación anatómica de la pared abdominal.
- Puede combinarse con separación anterior y posterior de componentes endoscópica.
- Resultados cosméticos.



MILOS vs. SUBLAY ABIERTO vs. IPOM

- Menor complicaciones intra operatorias.
- Menor dolor crónico.
- Menor recurrencia (seguimiento 12 meses).
- Significativa reducción de costos.



MILOS

- Herramienta más del cirujano de pared.
- Permite colocación de grandes mallas por mínimo acceso.
- Versátil: e-milos.
- Indicación para reparar defectos de línea media: Hernia epigástrica, Hernia Umbilical, Diastasis de rectos.



MUCHAS GRACIAS

