



II Congreso

Sociedad Hispanoamericana de Hernia

3, 4 y 5 de mayo de 2018

Aula Magna de la Fundación Jiménez Díaz

Madrid - España



ASOCIACIÓN MEXICANA DE HERNIA A.C.

grupo ARÁN de comunicación

Neurectomía inguinal abierta

Dr. Juan Carlos Mayagoitia González

León Gto. México



¿Requiere neurectomía?

Protocolo



¿Requiere neurectomía?

Protocolo


- Origen neuropático por mapeo
- Identificados los nervios afectados



¿Requiere neurectomía?

Protocolo


- Origen neuropático por mapeo
- Identificados los nervios afectados
- Pruebas diagnósticas (IH e II)



¿Requiere neurectomía?

Protocolo


- Origen neuropático por mapeo
- Identificados los nervios afectados
- Pruebas diagnósticas (IH e II)
- Presencia de malomas, granulomas, etc.



¿Requiere neurectomía?

Protocolo

- Origen neuropático por mapeo
- Identificados los nervios afectados
- Pruebas diagnósticas (IH e II)
- Presencia de malomas, granulomas, etc.
- Presencia o no de recurrencia



¿Requiere neurectomía?


Protocolo

- Origen neuropático por mapeo
- Identificados los nervios afectados
- Pruebas diagnósticas (IH e II)
- Presencia de mallomas (meshomas)
- Presencia o no de recurrencia herniaria
- Patologías agregadas (urológicas, angiológicas, medicina del deporte)




Neurectomía abierta vía anterior

- Más común
- Antecedente de abordaje anterior
- Nunca en antecedente de abordaje endoscópico




Neurectomía abierta vía anterior

- Más común
- Antecedente de abordaje anterior
- Nunca en antecedente de abordaje endoscópico
- Posendoscópico en lesión selectiva de IH o II (???)




Neurectomía abierta vía posterior

- Menos común
- Mayor complejidad
- Antecedente de abordaje anterior y endoscópico
- Neurectomía anterior fallida




Neurectomía abierta vía anterior

- Localización normal de los 3 nervios de la ingle





Nervios IH e IH en su emergencia


EIAS




Nervios IH e IH en su emergencia



Nervios IH e IH en su emergencia




Ilioinguinal



Iliohipogastrico

Nervios IH e IH en su emergencia




Ilioinguinal




Iliohipogastrico

Nervios IH e IH en su trayecto





Ilioinguinal




Iliohipogastrico


Rama genital en espacio preperitoneal



Rama genital en espacio preperitoneal





Lichtenstein



PHS o UHS



Rama genital en espacio preperitoneal




Rama genital en espacio preperitoneal




Mallomas, grapas, suturas, neuromas





Mallomas, grapas, suturas, neuromas



Mallomas, grapas, suturas, neuromas



Reparar hernia recidivante o recolocar la malla





Manejo del nervio seccionado

- Seccionarlo sin ligarlo
- Seccionarlo, ligarlo y sepultarlo (Dr. Parviz Amid)

Manejo del nervio seccionado


- Ligarlo siempre con sutura de degradación por hidrólisis
- Sepultarlo en la musculatura adyacente
- Evita el neuroma al unirse la mielina con un cuerpo extraño
- Produce dolor

Dr. Parviz Amid



Manejo del nervio seccionado


- Por vía endoscópica no se realiza ligadura



Estudio histopatológico transoperatorio



Resultados





Complicaciones de la neurectomía abierta

- Recidiva herniaria
- Abombamiento muscular (arco del transverso por denervación motora)
- Atrofia labio mayor en mujeres
- Persistencia del dolor (neurectomía fallida)

Conclusiones



- Indicación con evidencia objetiva (mapeo y pruebas diagnósticas)
- Descartar interacción de patologías agregadas
- Neurectomías selectivas
- Estudio transoperatorio de estructuras seccionadas
- Cirugía laboriosa y difícil