

Rehabilitación precoz multimodal quirúrgica

Programas de Recuperación Intensificada

FAST-TRACK Surgery

Enhanced Recovery After Surgery “ERAS”



Ainhoa Renedo Fernández
Servicio de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor
Hospital Universitario Basurto

REHABILITACIÓN PRECOZ MULTIMODAL

- Henrik Kehlet
- Dinamarca, principios de los 90
- Cirugía colorrectal
 - ✓ Dolor
 - ✓ Inmovilización
 - ✓ Íleo paralítico



REHABILITACIÓN PRECOZ MULTIMODAL

Período preoperatorio

- Educación del paciente
- Evitar ayuno preoperatorio prolongado
- No preparación mecánica intestinal

Período operatorio

- Anestesia combinada
- Restricción de fluidoterapia
- Normotermia intraoperatoria
- Prevención de NVPO
- Cirugía no invasiva

Período postoperatorio

- Retirada precoz de drenajes y SNG
- Control del dolor con anestesia epidural
- Nutrición enteral temprana
- Movilización precoz

- Disminución del estrés perioperatorio
- Mejora la función cardiopulmonar
- Inicio precoz de la tolerancia digestiva
- Menos complicaciones postoperatorias



Alta precoz
Menos costes económicos

White PF, Kehlet. H. *The Role of the Anesthesiologist in Fast-Track Surgery: from multimodal analgesia to perioperative Medical Care*. Anesth Analg 2007; 104: 1380-96

Moraca RJ, Sheldom DG, Thirlby RC. *The Role of epidural analgesia and anesthesia in surgical practice*. Ann Surg 2003; 238:663-673





Kehlet H, Holte K. *Effect of postoperative analgesia on surgical outcome*. Br J Anaesth 2001; 87: 62-72

- Grupo Español de Rehabilitación Multimodal (GERM®) www.grupogerm.es



- Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society www.erassociety.org
- Enhanced Recovery Partnership www.gov.uk

REHABILITACIÓN PRECOZ MULTIMODAL







RICA

Vía clínica de recuperación
intensificada en cirugía abdominal



SEDAR

Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación
y Terapéutica del Dolor

AEC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CIRUJANOS



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE UROLOGÍA



RICA

Vía clínica de recuperación intensificada en cirugía abdominal



Índice

	Página
Resumen ejecutivo	7
Introducción	9
Criterios de inclusión y exclusión	13
Objetivos	15
Metodología	17
Proceso Asistencial	19
Recomendaciones y fuentes de evidencia	23
I. Etapa Optimización preoperatoria	23
II. Etapa preoperatorio inmediato	38
III. Etapa intraoperatorio	42
IV. Etapa postoperatorio	65
Puntos Clave: Tabla resumen recomendaciones	69
Evaluación Vía Clínica: Indicadores	77
Proceso de implementación de la Vía Clínica	81
Anexos	
Anexo 1. Sistema de evaluación. Metodología GRADE	83
Anexo 2. Escala APFEL. Estratificación de riesgo de náuseas y vómitos postoperatorio	86
Anexo 3. Matriz Temporal Vía Clínica	87
Anexo 4. Figuras y Algoritmos Vía Clínica	89
Anexo 5. Encuesta de Satisfacción Vía Clínica	94
Anexo 6. Información al paciente sobre Vía Clínica	97
Anexo 7. Declaración de interés	101
Abreviaturas	103
Bibliografía	105

TIEMPO	PROTOCOLO	RESPONSABILIDAD
Previo al ingreso	Valoración preoperatoria. Optimización nutricional, cardiológica, de anemia y comorbilidad, si se precisa	Cirujano + Anestesiólogo
Preoperatorio inmediato (preferiblemente sin ingreso)	Adecuación dietética Iniciar profilaxis tromboembólica Ayuno 6 horas sólido y 2 horas líquido claro En cirugía de colon no es necesaria la preparación mecánica, siendo su empleo selectivo en cirugía de recto	Anestesiólogo + Enfermería + Cirujano
Peroperatorio	Preoperatorio inmediato Enema de limpieza 07:00h (en resección de recto-sigma en aquellos casos en que esté indicado) Medias compresivas o de compresión neumática intermitente Bebida carbohidratada 12,5% maltodextrinas 250ml 2 horas antes de la intervención Profilaxis antibiótica 1 h antes de incisión quirúrgica cuando esté indicado (o en quirófano)	Enfermería

TIEMPO	PROTOCOLO	RESPONSABILIDAD
Peroperatorio	Intraoperatorio Cateter epidural en cirugía abierta Inducción anestésica Oxigenación FiO2 0.6-0.8 Optimización hemodinámica mediante fluidoterapia guiada x objetivos Fluidoterapia: solución balanceada (3.5ml/kg/h en laparoscopia y 7ml/kg/h en laparotomía) Sondaje vesical si precisa Cirugía mínimamente invasiva (siempre que sea posible) No SNG Calentamiento activo con manta térmica y calentador de fluídos Profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios según escala de Apfel No drenajes Infiltración de los puertos de laparoscopia o bloqueo del plano transversal del abdomen (TAP) según intervención	Enfermería + Anestesiólogo + Cirujano
	Postoperatorio inmediato Mantenimiento activo de temperatura FiO2 0.5 durante 2 h tras intervención Analgesia multimodal Fluidoterapia restrictiva Inicio de tolerancia oral a las 6 h tras cirugía Inicio movilización a las 8 h tras cirugía Profilaxis tromboembolismo: enoxaparina 40 mg a las 6h tras cirugía	Enfermería + Anestesiólogo

TIEMPO	PROTOCOLO	RESPONSABILIDAD
1º día postoperatorio	Suplementación nutricional en casos seleccionados Dieta normal según tolerancia Valorar retirada de drenajes, si tiene Movilización activa (cama/sillón/inicio deambulaci3n) Analgesia endovenosa (no opi3ides) Si tolerancia oral correcta retirada de l3quidos endovenosos Retirada sonda vesical (si presenta)	Enfermería + cirujano
2º día postoperatorio	Dieta normal Deambulaci3n Profilaxis tromboembolismo Valorar alta a domicilio	Enfermería + cirujano
Durante resto de hospitalizaci3n	Dieta normal Analgesia oral Deambulaci3n Profilaxis tromboembolismo Valorar alta a domicilio	Enfermería + cirujano
Al alta	Mantener tromboprofilaxis 28 d3as tras cirug3a Control telef3nico tras alta Criterios de alta: no complicaciones quir3rgicas, no fiebre, dolor controlado con analgesia oral, deambulaci3n completa, aceptaci3n por parte del paciente Apoyo domiciliario-coordinaci3n con MAP	Enfermería + Cirujano + MAP

PREPARACIÓN INTESTINAL

Históricamente se pensaba que las preparaciones mecánicas intestinales, al reducir la carga bacteriana, disminuían la incidencia de infección de herida quirúrgica. También se pensaba que, al reducir la presión intraluminal, se reducía la incidencia de isquemia en la nueva anastomosis. Diversos estudios indican que la PMC no aporta beneficio, aumenta el riesgo de complicaciones como el íleo postoperatorio y de dehiscencia de sutura anastomótica y, altera el equilibrio hidroelectrolítico, lo que hace que pacientes ancianos o neoplásicos no acudan en condiciones óptimas a la cirugía.

22. La recomendación actual respecto a la preparación mecánica del colon es de no realizarla, excepto en aquellos casos de cirugía rectal en que existan posibilidades de estoma de protección.

Recomendación fuerte -. Nivel de evidencia alto.

- Pineda CE, Shelton AA, Hernandez-Broussard et al. Mechanical bowel preparation in intestinal surgery: a meta-analysis and review of the literature. *J Gastrointest Surg.* 2008;12:2037–44¹¹⁷.
- Gravante G, Caruso R, Andreani SM, et al. Mechanical bowel preparation for colorectal surgery: a meta-analysis on abdominal and systemic complications on almost 5000 patients. *Int J Colorectal Dis* 2008;23:1145-50¹¹⁸.
- Slim K, Vicaut E, Launay-Savary MV, et al. Updated systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials on the role of mechanical bowel preparation before colorectal surgery. *Ann Surg* 2009;249:203-9¹¹⁹.
- Guenaga KK, Matos D, Wille-Jorgensen P. Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery. *Cochrane Database Syst Rev* 2009;(1):CD001544¹²⁰.
- Wille-Jørgensen P, Guenaga KF, Matos D, Castro AA. Preoperative mechanical bowel cleansing or not? an updated meta-analysis. *Colorectal Dis.* 2005 Jul;7(4):304-10¹²¹.
- Guenaga KF, et al. Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery. *Cochrane Database Syst Rev* 2011;(9):CD001544¹²².
- Bretagnol F, et al. Rectal cancer surgery with or without bowel preparation: The French GRECCAR III multicenter single-blinded randomized trial. *Ann Surg* 2010;252:863–8¹²³.

23. La no preparación del intestino podría contribuir a una más rápida recuperación del peristaltismo intestinal y a una menor estancia hospitalaria.

Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia moderado.

- Howard DD, White CQ, Harden TR et al. Incidence of surgical site infections postcolorectal resections without preoperative mechanical or antibiotic bowel preparation. *Am Surg* 2009;75(8):659-63¹²⁴.

(Otros estudios de interés sobre este tema¹²⁵⁻¹²⁹)

FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO INTRAOPERATORIA

El poder oxidativo de los neutrófilos ha demostrado ser una de las mejores defensas contra las bacterias que alcanzan la herida quirúrgica. En un ambiente bajo en oxígeno, como el de la herida quirúrgica debido a hipo flujo microvascular, la función leucocitaria puede estar alterada. Se ha sugerido que aumentando el oxígeno tisular mediante aumento de la fracción inspirada, se podría mejorar la función de los neutrófilos, reduciendo la incidencia de infección de herida quirúrgica. Asimismo, también podría contribuir a una disminución de la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios.

45. La administración intraoperatoria de altas concentraciones de oxígeno (al menos FiO₂: 50%) es una estrategia suplementaria que disminuye el riesgo de infección de la herida quirúrgica en pacientes que precisan cirugía abdominal y que reciben profilaxis antibiótica.

Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto.

- Hovaguimian F, Lysakowski C, Elia N et al. Effect of intraoperative high inspired oxygen fraction on surgical site infection, postoperative nausea and vomiting, and pulmonary function. *Anesthesiology* 2013;119:303-16¹⁹².

46. La alta fracción inspirada de oxígeno reduce el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios, de forma más marcada en pacientes que reciben anestésicos inhalatorios sin profilaxis antiemética.

Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto.

- Hovaguimian F, Lysakowski C, Elia N et al. Effect of intraoperative high inspired oxygen fraction on surgical site infection, postoperative nausea and vomiting, and pulmonary function. *Anesthesiology* 2013;119:303-16¹⁹².

47. La alta concentración de oxígeno no aumenta la incidencia de atelectasias postoperatorias

Recomendación fuerte +. Nivel de evidencia alto.

- Hovaguimian F, Lysakowski C, Elia N et al. Effect of intraoperative high inspired oxygen fraction on surgical site infection, postoperative nausea and vomiting, and pulmonary function. *Anesthesiology* 2013;119:303-16¹⁹².

(Otros estudios de interés sobre este apartado¹⁹³⁻¹⁹⁷)

Algoritmo manejo analgesia



Recomendaciones sobre manejo de Analgesia:
De R 67 á R 87

*: Criterios de mala f(x) pulmonar
**: Criterios de mantenimiento de catéter
AL: Anestésicos Locales

*Muchas gracias por vuestra
atención*



Definición y conceptos

- 1) bloqueos interfasciales de la pared torácica
 - 2) bloqueos interfasciales de la pared abdominal
- **No consisten en el bloqueo selectivo de un solo nervio**
 - Administración del anestésico local en un **espacio virtual formado entre las fascias musculares**, que nosotros creamos a base de rellenar con el anestésico, de forma que este se va a distribuir en todas las dimensiones por ese espacio que es **atravesado por cada una de las ramas de los nervios** espinales a medida que estas perforan la musculatura en su trayecto hacia la superficie.
 - Hay **necesidad** de administrar un **volumen adecuado**; en estos bloqueos la **concentración** del anestésico local puede **disminuirse** y la **eficacia** del bloqueos pasa a **depender del volumen administrado, siempre y cuando se respeten las dosis máximas** de anestésico local
 - La dispersión del anestésico se ve facilitada por el movimiento d la caja torácica durante los movimientos respiratorios.
 - El anestésico local no solo difunde en el espacio fascial si no que **también penetra a través de las fascias**, de forma todas las ramas de los nervios espinales acaban impregnadas de anestésico, de forma indirecta.